

Saillie prosternale parallèle entre les hanches, brusquement rétrécie au delà et terminée en pointe. Épisternes métathoraciques larges en arrière, fortement rétrécis en avant et formant un triangle allongé. Hanches postérieures subparallèles, à bord inférieur sinué. Dernier segment abdominal échanuré. Pattes noires, tarsi ferrugineux.

Très voisine de *singularis*; en diffère par ses antennes (sauf 2^e article) et ses pattes (sauf les tarsi) noires et le dernier segment abdominal échanuré.

DIAGNOSES DE *PTINIDES* ET *ANTHICIDES* [COL.] DES COLLECTIONS
DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR M. PIC.

Ptinis Langueti n. sp.

Peu allongé, presque parallèle, noir, orné de dessins blancs avec les antennes et pattes roussâtres: soies dressées assez longues, en partie obscurcies. Tête avec les yeux petite, moins large que le prothorax; antennes roussâtres, assez fortes, plus longues que la moitié du corps, non épaissies à l'extrémité. Prothorax court, élevé en bosse transversale sur son milieu (celle-ci un peu dilatée sur les côtés) transversalement sillonné, déprimé antérieurement, modérément étranglé devant la base et un peu élargi ensuite sur les côtés. Écusson assez petit, plus long que large. Élytres bien plus larges que le prothorax, peu longs, droits en avant et sur les côtés antérieurs (avec les épaules arrondies et saillantes), un peu atténués à l'extrémité, peu convexes; ils sont d'un noir brillant et présentent les dessins suivants, faits d'une pubescence écailleuse blanche et dense: une grande macule humérale ne paraissant pas atteindre la suture et une fascie postmédiane, celle-ci prolongée en arrière sur la suture de façon à dessiner une sorte de V commun aux deux étuis, pourtour postérieur des élytres également orné de pubescence blanche; élytres à stries peu profondes et finement ponctués avec les intervalles assez larges, nettement ponctués en lignes. Pattes assez robustes, roussâtres.

Long. 3 mill. Tonkin (Langue), 1886.

Rappelle *Pt. Theresae* Pic, du Brésil, mais dessin élytral différent, antennes claires, moins fortes, prothorax plus élargi au milieu, etc. Dédié au voyageur qui a rapporté cette espèce.

Ptinus sulcithorax n. sp.

Subovalaire, assez large sur les élytres, brun roux sans taches, hérissé de soies jaunâtres irrégulières, avec les antennes, les pattes et le prothorax

densément revêtus d'une pubescence jaune fine. Tête avec les yeux petite, moins large que le prothorax et fortement inclinée; antennes claires, densément pubescentes, assez longues et atténuées à l'extrémité. Prothorax particulier, se rapprochant un peu de celui de *bidens* Oliv. ♀, densément et uniformément pubescent, à peine plus large en avant qu'en arrière, profondément sillonné dans toute sa longueur au milieu et orné d'une courte dent latérale de chaque côté, celle-ci séparée de la partie médiane par un sillon fossiforme bien marqué (vu en avant, le prothorax présente quatre saillies dentiformes émoussées, en dessus, les médianes étant plus hautes, séparées par des sillons). Écisson non visible. Élytres très convexes, subovalaires et assez larges sur leur milieu, très diminués en avant avec les épaules nulles, pas plus larges que la base du prothorax antérieurement et ornés d'une petite carène humérale, courtement atténués en arrière et déclives sur leur portion postérieure. Élytres nettement striés avec une ponctuation en carré très forte, intervalles étroits, un peu élevés. Pattes assez robustes, les tibias postérieurs étant arqués en dedans.

Long. 3 mill. 3. Se-Tchouen : Tatsienlou (P. Dejean), 1898.

Cette espèce est très intéressante, car elle offre une forme très particulière en se rapprochant du genre *Niptus* par la forme élytrale et présentant l'aspect d'un *Ptinus* par la structure du prothorax. Provisoirement, on peut la placer dans le voisinage du groupe des *Cyphoderes*, en attendant la venue de nouveaux spécimens qui permettront de l'étudier mieux et peut-être de créer à son profit un genre ou sous-genre nouveau.

Pristocyphus ⁽¹⁾ **Bouvieri** n. sp.

Oblong, convexe, brillant, testacé-roussâtre, avec les antennes et les pattes pâles, orné d'une pubescence claire, assez longue et espacée avec quelques longs poils dressés. Tête longue, déprimée, presque lisse, creusée de chaque côté derrière les antennes avec les yeux noirs, grands. Antennes grêles, très longues, à 1^{er} article très long, épaissi au sommet, les suivants cylindriques; 2^e plus de moitié plus court que 3^e, celui-ci un peu plus court que 4^e, dernier à peu près de la longueur du précédent. Prothorax étroit et long, bien étranglé à la base, avec de longs poils dressés sur les côtés; il est muni d'une corne longue dont l'extrémité est tronquée et un peu relevée, les côtés étant munis de trois dents un peu relevées et le dessus orné de granulations (prothorax orné aussi parfois, sur les côtés, de granulations semblables) brunes. Élytres subovalaires, obliquement diminués en avant, subarrondis à l'extrémité, ornés d'une faible dépression antérieure; ils sont finement ponctués et présentent une pubescence longue et peu serrée, plus marquée en arrière et sur les côtés, avec de longs poils

(1) Genre nouveau établi par M. Fairmaire (*Bull. Fr.* 1898, p. 37) pour une espèce de Suberbieville capturée par M. H. Perrier.

dressés; côtés médians un peu rembrunis. Pattes longues, grêles, avec les tarses postérieurs plus longs que les tibias.

Long. 4 millimètres. Madagascar : Baie d'Antongil (A. Mocquerys). 1898.

En décrivant *Pr. Perrieri*, M. Fairmaire le dit analogue de coloration à *Mecyotarsus rhinoceros*; par conséquent, *Pr. Bouvieri*, très peu pubescent sur les élytres, ne peut être identifié à cette espèce.

Il est bien juste que je donne à une des plus intéressantes espèces décrites dans ce mémoire le nom du sympathique professeur qui m'a permis de les étudier.

Le genre *Pristocyphus* est très nettement reconnaissable à la structure particulière du prothorax, dont la corne est tridentée de chaque côté, et à la grande longueur des antennes.

***Anthicus Maindroni* n. sp.**

Allongé, subparallèle, en majeure partie brun roussâtre, avec les deux tiers postérieurs des élytres obscurcis; forme de *armatus* Trug., avec aussi une pubescence double, mais dessin élytral différent, fait d'une seule fascie posthumérale oblique claire, et 1^{er} article des antennes renflé, mais sans dent distincte. Tête forte, tronquée en arrière, à ponctuation peu fine et peu écartée; yeux noirs; antennes courtes et peu fortes, à 4^{er} article gros, mais non muni d'une dent saillante. Prothorax assez long, en trapèze, légèrement arrondi et peu élargi en avant, à ponctuation assez fine et peu écartée. Écusson petit. Élytres subparallèles, ayant les épaules arrondies et l'extrémité tronquée, avec une ponctuation assez fine et peu écartée; ils présentent la partie humérale rembrunie et ensuite une fascie oblique roussâtre claire, densément revêtue d'une pubescence grise, argentée; le reste des élytres est bien obscurci. Dessous du corps un peu roussâtre, avec l'abdomen parfois obscurci; pygidium saillant. Pattes d'un roussâtre clair, assez courtes et peu fortes.

Long. 3-3,6 millim.

Indes occidentales : Kurrachee (Maindron), 1896.

Dédié à M. Maurice Maindron, qui l'a recueilli.

Forme de dessin de *A. armatus* Trug. et espèces voisines, mais sans dent saillante sur le 1^{er} article des antennes. *A. subarmatus* Pic (*in litt.*), de l'Asie centrale, voisin par la structure antennaire de *A. Maindroni*, en diffère par la présence de deux fascies claires aux élytres, et la partie humérale moins largement rembrunie.

***Anthicus Lesnei* n. sp.**

Peu allongé, brillant et peu pubescent, testacé-rougâtre, avec les élytres ornés d'une bande transversale médiane et d'une large tache apicale, noires. Tête finement ponctuée, nettement atténuée et subconifère en arrière;

yeux gris; antennes testacées, courtes, épaissies à l'extrémité. Prothorax finement ponctué, assez long, modérément dilaté en avant, faiblement étranglé devant la base, celle-ci ornée de deux petits tubercules peu marqués. Écusson grand. Élytres subovalaires, nettement diminués en avant, assez atténués et subarrondis à l'extrémité (avec les épaules marquées, quoique arrondies), un peu déprimés sur le disque, à ponctuation peu forte et écartée. Pattes testacées, grêles.

Long. 2 millimètres environ.

Indes occidentales : Kurrachee (M. Maindron), 1896.

Dans le groupe des *Anthicus Cyclodinus*, cette espèce est bien caractérisée par sa coloration et la forme élytrale assez diminuée en avant.

Dédié à M. P. Lesne, du laboratoire d'entomologie, dont les études sont spécialement appliquées aux Coléoptères.

Anthicus trapezithorax n. sp.

Assez large, brillant, à pubescence obscure, mi-soulevée, assez fournie, noir avec les antennes, les tibias et tarses vaguement roussâtres. Tête forte, subtronquée en arrière, à ponctuation assez forte, peu espacée; yeux gris foncé; antennes courtes et fortes, épaissies à l'extrémité. Prothorax trapézoïdiforme, tout à fait dilaté en avant, plus large que la tête dans cette partie, fortement rétréci en arrière, à ponctuation nette, peu espacée. Écusson petit. Élytres convexes, relativement courts, bien plus larges que la base du prothorax, presque droits en avant, un peu élargis après le milieu, à peine diminués et nettement arrondis à l'extrémité, à ponctuation très forte, rapprochée. Pattes assez courtes, vaguement roussâtres, avec les cuisses un peu épaissies et obscurcies.

Long. 2 mill. 6.

Madagascar : Baie d'Antongil (A. Mocquerys), 1898.

Remarquable dans le groupe de *A. flovalis* L. par sa coloration foncée, jointe à la forme de son prothorax, celui-ci étant très nettement dilaté en avant, plus large que la tête.

Anthicus Mocquerysi n. sp.

Oblong, convexe, peu brillant, à pubescence grisâtre, peu fine et couchée, entièrement testacé-brunâtre, à ponctuation générale forte et rapprochée. Tête grosse, relativement longue, large, très densément ponctué avec une sorte de ligne médiane lisse, tronquée en arrière et légèrement échancrée sur son milieu; yeux noirs, grands; antennes assez longues, modérément fortes, presque filiformes. Prothorax convexe, dilaté-arrondi en avant, plus long que large, presque de la largeur de la tête, subtronqué en avant avec les angles cependant bien arrondis, un peu et courtement diminué en arrière, rebordé à la base. Écusson petit. Élytres subparallèles presque droits en avant, bien atténués à l'extrémité et subarrondis sur

cette partie, avec la suture en partie surélevée. Pattes testacées, peu épaisses.

Long. 2 millim. environ.

Madagascar : Baie d'Antongil (A. Mocquerys), 1898.

Rappelle *A. Mellyi* Pic. d'Égypte, mais moins allongé, plus robuste, avec la tête plus forte, autrement ponctuée.

Dédié à M. A. Mocquerys, qui a recueilli cette espèce, ainsi que plusieurs autres décrites dans ce mémoire.

DEUX ESPÈCES NOUVELLES DU GENRE *AMBLYTHYREUS* WESTW. (HÉMIPTÈRES-PHYMATIDES), DES COLLECTIONS DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS.

PAR ANT. HANDLIRSCH (VIENNE).

***Amblythyreus Oberthüri* n. sp.**

♂. Tête bien plus courte que chez *A. Stali* Handl., sa partie postérieure moins allongée et sensiblement plus large que la partie antéoculaire. Bucculae distinctement lobées et bien limitées; bord inférieur de la tête pourvu de dents bien plus prononcées que chez *A. Stali*.

Rostre semblable à celui des autres espèces. Le 1^{er} article des antennes deux fois aussi long que large, le 2^e presque deux fois, le 3^e à peu près trois fois aussi long que large, le dernier article un peu plus que quatre fois et demi plus long que large et à peu près deux fois aussi long que les deux précédents ensemble.

Pronotum des deux tiers plus large que long, aplati, à peu près triangulaire, à angles latéraux bien moins prononcés et moins prolongés en avant que chez les autres espèces du genre: bords latéraux moins sinués; ligne médiane presque obsolète; carènes effacées en avant et en arrière: angles latéraux acuminés en triangle, dirigés presque directement en dehors et un peu en haut.

Les pattes antérieures ne diffèrent pas beaucoup de celles des autres espèces connues, leurs hanches sont aussi longues que celles de l'*Aubl. Stali*. Membrane foncée, à nervures obscures.

Scutellum aplati, sans carène, assez distinctement rebordé, en forme de langue et largement arrondi au sommet; il est environ d'un quart plus long que large et il s'étend presque jusqu'au milieu de l'abdomen.

Abdomen de forme rhomboïdale, pas aussi large que chez *A. Stali* et aussi long que large; sa partie la plus large n'est pas située dans la région du 3^e segment, comme chez les autres *Amblythyreus*, mais à la fin du 2^e. Le connexivum du 3^e segment ne proémine pas en forme d'angle.

Tête et partie antérieure du pronotum pourvues de granulations plus